

התאמת סדרת טיפולים
היפר-פיגמנטציה
Clear Lift || Dye SR

שם הלקוח/ה: _____

תאריך הייעוץ: _____

אנא סמני/ את התשובות המתאימות ביותר:

סוג ההיפר פיגמנטציה	שמש וגיל	PIH	הורמונלית
אזור הטיפול	ידיים	דקולטה	פנים
גוון העור	1-3	4	5
גוון הנגע	5	4	3
עומק הפיגמנטציה	אפידרמלית	אפידרמל-דרמל	דרמלית
גיל הנגע	עד שנה	שנה עד שלוש שנים	יותר משלוש שנים
התפשטות הנגע	נמשים	נגע בודד	סימטרי
שימוש בקרם לחות	כן, פעמיים ביום	לפעמים	לא משתמש/ת
שימוש בקרם הגנה	כל יום	רק בחשיפה לשמש	**לא משתמש/ת
סה"כ סימונים			
מספר הטיפולים המוערך	4	5-6	6+ וטיפול שימור

* מספר הטיפולים המוערך נקבע על פי הטור בו מספר הסימונים הגבוה ביותר
** יש לשקול השפעת פרמטרים משמעותיים בחישוב כמות הטיפולים

סוגי היפר-פיגמנטציה

כתמי שמש - Solar lentigo

כתמים עוריים שטוחים, בעלי גבולות סדירים, הנראים בגוון חום בהיר עד חום כהה. הנגעים מופיעים בעיקר באזורים חשופים לשמש (פנים וגב היד) ונגרמים עקב ריבוי מלנין בתאי העור. ברוב המקרים הם שפירים וניתן להבחין בהם בקלות על פי המראה והמיקום. במקרה הצורך יש לבצע ביופסיה של העור כדי לשלול נגעים סרטניים.

היפר פיגמנטציה פוסט דלקתית - PIH

היפר-פיגמנטציה המופיעה לאחר דלקת כתוצאה מטרומה. מופיעה בעיקר בגווי עור כהים ועלולה להימשך חודשים/שנים.

מלזמה - Melasma

היפר-פיגמנטציה המופיעה לרוב על פני המצח, האף והלחיים ושכיחה בעיקר בקרב נשים. התופעה מכונה "מסכת היריון" והופעתה קשורה בעיקר בשינויים הורמונאליים, אך גם בחשיפה לשמש ונטילת תרופות. ממוקמת בשכבה השטחית יותר, האפידרמלית או העמוקה, הדרמלית. או משולבת. לרוב מדובר בהיפר-פיגמנטציה עיקשת הנוטה לחזור.

תיאום ציפיות

התוצאות הקליניות של הטיפול עשויות להשתנות מאדם לאדם ובין אזור אחד בגוף למשנהו, בשל מספר רב של גורמים. מסיבות אלו, לא ניתן לחזות במדויק את מספר הטיפולים הנדרשים להשגת תוצאה אופטימלית.